

Intravitrealinjektioner, ej Ozurdex

Gäller för: Ögonkliniken

Faktaägare: Karin Hjelmberg

Karin Ylvén

Läkemedel

Avastin - engångs ampull/spruta (då ej engångsampull/spruta kan tillhandahållas se nedan Avastin-flergångsampull).

Eylea - engångs ampull

Lucentis - förfylld spruta

Ovanstående läkemedel ska inte användas under graviditet!

Rekommenderad dos är 0,5 mg = 0,05 ml.

Material

IVT-set (custom pack)

Handskar

Arbetsgång

Kontrollera identitet och att rätt öga är märkt.

Bedöva med Tetrakain. Skölj konjunktivalsäck med klorhexidinlösning 0,5 mg/ml. Huddesinfektion med klorhexidinsprit 5 mg/ml.

Varje injektion:

Invitriakoppen appliceras centralt på bulben och roteras. Via sidoöppningen på invitrian injiceras läkemedlet i glaskroppen.

Avsluta med att ge en droppe Kloramfenikol 0,5% endospipett.

Avastin-flergångsampull

Okulärbesiktiga lösningen.

Sprita av injektionsflaskans gummimembran.

Sjuksköterska sätter en minispika i injektionsflaskan. Koppla en tvåvägsventil till minispiken.

Giltig fr.o.m: 2017-08-29
Giltig t.o.m: 2019-08-29
Identifierare: 93796
Intravitreal injektioner, ej Ozurdex



Ventilen spritas av inför varje ny dos mekaniskt i minst 15 sekunder. Låt sedan lufttorka i 5 sekunder.

Avastin uppdrages i 1 ml-sprutan. Innehållet skall sprutas ut tills kolvens spets är i linje med strecket som markerar 0,05 ml på sprutan.

OBS! Tänk på att hela kanylen är helt fylld med Avastin så att det inte finns någon luft i systemet.

Avastin 0.05 ml ges intravitrealt efter sedvanlig märkning och bedövning.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.