

Toxoplasma

Gäller för: Ögonkliniken

Faktaägare: Cristin Holm
Karin Ylvén

Retinochoroidit. Aktivering av congenitala förändringar i de flesta fall.

- Unilateral
- Unifokal, aktiv härd i ett öga, inaktiva pigmenterade fläckar kan dock ses bilateralt.
- Trycket ofta förhöjt
- Vitreit i anslutning till den aktiva härden
- Varierande irit

Behandlingsprinciper

- Hämma trophozoiterna med kausal terapi
- Dämpa den inflammatoriska reaktionen med steroider systemiskt

Behandlingsindikationer

1. papill- och maculanära härdar som hotar synen
2. stora härdar (>2PD) med kraftig irit eller serös avlossning
3. alla aktiva härdar hos immuninkompetenta patienter

Behandling

- T. *Azítromax* 250 mg, 500 mg första 2 dagarna, därefter 250 mg x 1 i 4 veckor, (biv diarré. Teratogent).
- Efter 2-3 dagar *steroider* 30-45 mg, ex tabl Prednisolon 30 mg i 8 dagar, därefter 20 mg i 1 mån, nedtrappning under 3-5 veckor.
- Alternativt: T. *Bacrim Forte* 1 x 2 i 4 veckor. Ev. *Azítromax* + *Bacrim forte*.

Den mest effektiva behandlingen är Daraprim kombinerat med Azitromax, men på grund av Daraprim's biverkningsprofil (påverkar blodbilden, teratogent blanda annat) ges kombinationen då det centrala seendet är hotat.

T Daraprim 25 mg, 50 mg i 2 dagar därefter 25 mg dagligen i 3-4 veckor, kontroll av blodstatus 1-2 ggr/vecka (Daraprimbehandlingen avbrytes vid vita blkr <4000 och/eller vid trbc <100 000). T Folacin 5 mg 2 ggr/vecka samtidigt som D. Efter 2-3 dagar tillägg av steroider vid behov, som ovan. Alternativ behandling Wellvone, lindrig biverkningsprofil, mycket dyrt, används endast i undantagsfall, 5 ml 2 ggr dagligen i 3-4 veckor.

- Behandling av barn i samråd med barnläkare.
- Vid immun inkompetens: Behandl. I samråd med pats behandl. läk.

Viktigt!

- Ge aldrig enbart generella steroider, kombinera med kausal Toxoplasmabehandling
- Ge aldrig priokulära steroider vid Toxoplasma.
- V.b intravitreal inj; $\left\{ \begin{array}{l} \text{steroider – Dexametazon – 400 mg} \\ \text{ab – Clindamycin, 1 mg/0,1 ml} \end{array} \right.$
- Dexametazon (kort $\frac{1}{2}$ -tid i glaskroppen), kan ges intravitrealt vid steroidintolerans.

Diagnos

Serologi.

Klin. fynd.

PCR – helst på AC-punktion, hög sensitivitet.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.