

Blåljuscystoskopi indikationer Ljungby

Gäller för: Kirurgkliniken Ljungby

Utförs på: Kirurgmottagningen Ljungby

Innehållsförteckning

1	Indikationer.....	2
2	Pre medicinering.....	2
3	Blodförtunnande medicinering.....	2
4	Patientinformation.....	2

1 Indikationer

Lågrisk

Patienter med singel/multipla småtumörer som bedöms kan hanteras genom px/koagulation på mottagning. <5 mm.

Medium/högrisk

Cystoskopi/px patienter med oklara förändringar

CIS-misstanke

6 månaders kontroll av högrisk patienter T1 efter TUR-B

Patient med pacemaker/ICD

Dessa undersökningar utförs på operation.

2 Pre medicinering

Patienten ska ta 2 gram Alvedon i hemmet inför undersökningen.

3 Blodförtunnande medicinering

Patienter som medicinerar med Waran, Warfarin, Xarelto, Eliquis eller Pradaxa hör enligt bilaga i kallelse av sig till AK-mottagningen för hjälp med utsättning inför undersökningen.

Övriga blodförtunnande preparat exempelvis: Brilique, Clopidrogel, Cloriocard, Pletal, Crepid, Efient, Plavix, Trombyl beslutar uppsättande läkare om uppehåll.

4 Patientinformation

Till dig som ska genomgå cystoskopi med Hexvix.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare