

Höftprotesluxation - sluten reposition

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Operationsenheten Växjö

Faktaägare: Fredrik Kullberg, överläkare

Skribenter: Barbara Hipp, Marie Sandén Tornberg, Anette Jonasson, Anna-Marit Löfmark, Emma Frejd, Eva Hagelberg, Anette Asthede Rydström.

Innehållsförteckning

1	Indikation	2
2	Preoperativa förberedelser.....	2
2.1	Patient.....	2
2.2	Anestesi.....	2
2.3	Operation.....	2
3	Särskilda observanda.....	2
3.1	Anestesigång.....	2
3.2	Operationsgång.....	2
4	Position.....	2
5	Utrustning	2
6	Hygien.....	3
7	Elimination.....	3
8	Anestesi.....	3
9	Peroperativ vård	3
10	Postop	3

1 Indikation

Patient med höftprotes där ledhuvudet har hoppat ur sin skål.

2 Preoperativa förberedelser

2.1 Patient

- Kontroll enligt WHO:s checklista för säker kirurgi.
- [Akuta operationer-rutiner och prioriteringar](#)
- [Preoperativa rutiner för slutenvårds- och dagkirurgiska patienter](#)
- [Preoperativa undersökningar inför operation på anestesi kliniken](#)
- [Premedicinering av vuxna inför operation](#)
- [Preoperativ helkroppsdusch och hårkortning](#)
- [Preoperativa åtgärder för att undvika förväxlingar i samband med operativa ingrepp - Operatör ska sidomarkera aktuell kroppsdel före anestesi start.](#)
- [Trombosprofylax](#)
- Noggrann [trycksårsprofylax](#)

2.2 Anestesi

- Vidta nödvändiga profylaktiska åtgärder för att undvika peroperativ hypotermi, [Hypotermi – perioperativ profylax och behandling.](#)
- [Rutiner för blodgruppering och BAS-test/blodbeställning på ortopedsektionen](#) – Lokala anvisningar.
- Blodgruppering: Nej.
- Bastest: Nej.

2.3 Operation

- C-båge uppkopplas på salen

3 Särskilda observanda

3.1 Anestesigång

Operatör ska vara på plats vid sövning.

3.2 Operationsgång

Operatören drar leden i rätt position under intravenös anestesi.

4 Position

Diskutera med operatör om reposition skall göras i patientens säng eller på operationsbordet. Vid en förväntad svår reposition föredras operationsbord.

5 Utrustning

- C-båge – Strålskyddskläder till personalen.

6 Hygien

- Mössa – hjälmmodell
- [Arbetskläder](#) – Lokala anvisningar
- [Personalföreskrifter för operationsavdelning](#) – Vårdhandboken.

7 Elimination

- Patient ska bladderscannas efter avslutad operation enligt riktlinjer.
- [Övervakning av urinblåsa i samband med operation-vuxna patienter](#) – lokala anvisningar.

8 Anestesi

- I första hand sedering med mask. Alternativt larynxmask eller intubation på patientspecifik indikation.
- Utförande: Propofol/Alfentanil. Vid svåra fall behövs muskelrelaxantia (Suxametonium).

9 Peroperativ vård

[Peroperativ vård](#) – Vårdhandboken.

10 Postop

[Postoperativ riktlinje anestesikliniken Växjö](#)

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.