

## Ilomedinbehandling

**Gäller för:** KirurgklinikenKirurgkliniken

### Bakgrund

Iloprost som är den aktiva substansen i Ilomedin, är en stabil prostacyclinanalog. Aktiveringen av trombocyter och leukocyter minskar, detta leder till minskad cellaggregation, och förbättrad mikrocirkulation. Kan övervägas vid grav perifer ischemi där kärlkirurgisk åtgärd ej är möjlig.

### Vid inskrivning

Ingen medicinförändring.

### Administrering

Intravenös infusion med infusionspump, ges vanligen under 6 timmar/dygn. Behandlinseffekten utvärderas efter 2 veckor. Ev förlängd behandling ytterligare 1-2 veckor.

### Spädning

Ilomedin användes efter spädning till 0,2 ug/ml.

### Dosering

Vanlig startdos till normalviktig är 10 ml/tim. Upptitreringen till 15-20 ml/tim efter något dygn.

### Biverkningar

Dosberoende, snabbt övergående vid dosreduktion.

Vanligast huvudvärk och illamående. F ö se FASS.

### Efterbehandling

Behandlingseffekten kvarstår ofta 3-6 månader, ibland längre tid.

### Uppföljning

I normalfallet ingen planerad uppföljning.