

Tourniquet - åtgärder på sjukhus

Gäller för: Region Kronoberg

Avsnörande förband, Combat Application Tourniquet C-A-T, ingår i ambulansens utrustning. Tourniquet finns också i militärens och polisens utrustning.

Indikation

- vid livshotande blödning under primär undersökning
- blödning som ej kan kontrolleras med tryckförband eller manuellt tryck

Patient inkommer med tourniquet

- Läkare bör om möjligt vara närvarande när patienten anländer till akutmottagningen eller möta upp snarast.
- Tidpunkten då den är anlagd ska finnas noterad i tidsfältet på tourniqueten. Tourniqueten bör avlägsnas inom två timmar förutsatt att patienten är stabil p.g.a. risken för permanenta nerv- och muskelskador.
- En korrekt anlagd tourniquet är smärtsam, varför smärtlindring kan behövas för att patienten skall tolerera tourniqueten.
- Tourniqueten lämnas synlig.
- På sjukhuset tas tourniqueten av efter beslut av läkare.

Patient med extremitetsblödning utan tourniquet

- Vid livshotande blödning kan tourniquet sättas temporärt under primär undersökning
- När tid finns exponeras skadan och tryck anläggs direkt mot blödningen med finger eller instrument.
- Anlägg tryckförband. Eventuell sårhåla packas först med gasbinda.
- Reponera felställda frakturer och immobilisera.
- Hjälper inte ovanstående anläggs tourniquet så distalt som möjligt, helst direkt mot hud.
- Dra åt tills blödningen avtar. Vid utebliven effekt kan ytterligare en tourniquet sättas ovanför. Liten sivande blödning kan kvarstå trots korrekt anlagd tourniquet om det blöder från benmärgen.

- Notera tiden när tourniqueten anläggs i tidsfältet på tourniqueten och lämna den synlig.
- En korrekt anlagd tourniquet är smärtsam, varför smärtlindring kan behövas för att patienten skall tolerera tourniqueten.

Tourniqueten tas av efter beslut av läkare. Den bör avlägsnas inom två timmar förutsatt att patienten är stabil p.g.a. risken för permanenta nerv- och muskelskador.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare