

Checklista för behandling med Prolia

Gäller för: Region Kronoberg

Faktaägare: Daniel Albertsson, distriktsläkare vårdcentralen Moheda
Snjezana Barbir, överläkare akutgeriatriska kliniken Växjö
Michael Anderzon, överläkare medicinkliniken Växjö

Personnummer _____

Namn _____

Övrigt _____

Ordinationsdatum _____ **Läkare** _____

- Pågår eller planeras invasiv tandvård? Ja Nej
- Allergier? Ja Nej
- Kalk- och D-vitaminbehandling
- Provtagning 1–2 veckor före varje planerad behandling (S-kalciumjon och P-kreatinin).
Räkna vid behov ut absolut GFR.
Risken för hypokalcemi är högre vid GFR <30 ml/min.
- Normalt värde S-kalciumjon
- Provtagning även 2 veckor efter första behandling (S-kalciumjon och P-kreatinin) för att utesluta hypokalcemi. Om GFR > 30 ml/min behövs ej uppföljande prov tas efter följande injektioner.

- Kallelse och [patientinformation](#) skickad till patienten
- Prolia injektionsvätska 60 mg rekvireras i beställningsmall för läkemedel
- Behandlingsdatum _____
- Patienten är utrustad med telefonnummer till sjuksköterska/mottagning
- Nästa behandling _____

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare