

## PD-kateteroperation

Gäller för: Medicinkliniken Växjö, Region Kronoberg.

### PREOPERATIVT

Operationsplanering	Datum / Sign
Remiss i Cosmic till kärlikirurg.	
Kontrollera patientens läkemedelslista: <ul style="list-style-type: none"><li>• Vid behandling med högdos acetylsalicylsyra (tex Treo), ska detta vara utsatt 7 dagar före op.</li><li>• Behandling med trombocytaktivt läkemedel (tex Clopidogrel) eller ticagrelor ( tex Brilique) ska sättas ut minst 7 dagar före op, kontakta läkare.</li><li>• Behandling med enbart acetylsalicylsyra lågdos ( tex Trombyl 75 mg) behöver ej sättas ut före op.</li><li>• Om behandling med acetylsalicylsyra + trombocytaktivt läkemedel, kontakta operatör.</li><li>• Vid behandling med warfarin, kontakta AK-mottagningen.</li></ul>	
PD-ssk kallar patienten för inläggning.	
<b>Inskrivningsdagen</b>	
Ordination av antibiotikaprofylax/smärtlindring: <ul style="list-style-type: none"><li>• Inf. Ekvacillin 2 g iv ges när pat. förs till op.</li><li>• T. Alvedon 2 g (om vikt över 50kg)</li></ul>	
Prover: Njurblock, P-APT, PK	
Blodgruppering	
Kontakta kirurgsektionens narkosläkare för narkosbedömning, samt: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ordination av läkemedel operationsdagens morgon.</li><li>• Ordination av ev premedicinering, samt ev. insulin.</li></ul>	
Ev. Infusion ordinerad.	
Patienten informeras om ingreppet och pre/postoperativ vård.	
Preoperativ information av sjukgymnast.	
Descutan dusch 1 kvällen innan op.	
Renbäddad säng.	
Fasta från kl. 24:00.	

Operationsdagen	Datum / Sign.
Descutan dusch 2 op. Morgon.	
Op-skjorta och strumpor påtagna.	
Borttagande av sänghävert.	
Patient och patientsäng ID-märkt.	
Perifer venkateter satt.	
Smycken / värdesaker / glasögon avlägsnade och inlåsta.	
Nagellack / smink borttaget.	
Rengjord navel.	
Tömd urinblåsa, vid osäkerhet tas bladderscan.	
Medtag PD-korg till operation. Innehåller: Värmeplatta, dialysvätska, PD-kateter, kateteradapter, kateterförlängning.	

Postoperativ	Datum / Sign.
Sängläge till dagen efter op. pga läckagerisk vid PD-kateter. Patienten kan åka rullstol till toalett	
Kontroll av PD-förband, byt förband eller förstärk förbandet. Viktigt att PD-katetern är fixerad	
Ett påsbyte med 500 ml görs efter operationen, vid blodigt dialysat görs påsbyte varannan timme med 500ml av den svaga lösningen tills vätskan klarnat. Avsluta med 500ml in och sätt på jodhatt efter varje påsbyte. Dokumentera i Cosmic	
Återlämna ev. smycken/värdesaker	
Informera patient: <ul style="list-style-type: none"><li>• Undvik att blöta ner förbandet första veckan.</li><li>• Lyft ej tungt upp till två veckor efter op.</li><li>• Rör ej förbandet på en vecka.</li><li>• Undvik kläder som skaver mot PD-katetern.</li><li>• Lämna skriftlig information.</li></ul>	
Hem dagen efter operation.	
Suturtagning 10 dagar efter operation, ombesörjs av PD sköterska	
PD-ssk bokar tid för omläggning av PD-katetern en vecka efter op.	

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.**