

Bronkoskopiundersökning

En information om undersökning av nedre luftvägarna.

Avsikten med en bronkoskopiundersökning är att se hur luftvägsslemhinnan ser ut, leta efter förändringar och ta prov på dessa. Du är vaken och andas själv hela tiden, men du kan inte prata. Undersökningen sker under lokalbedövning. Du får lugnande och smärtstillande läkemedel före undersökningen.

Själva instrumentet (bronkoskopet) är en ca 5 mm bred, böjlig slang som förs ner i luftvägarna via näsan eller munnen.

Undersökningen gör inte ont, men kan reta till hosta och irritationskänsla i luftvägarna. EKG och syremättnad följs under undersökningen.

Undersökningen tar 15-30 minuter.

Före undersökningen

Du får inte äta, dricka eller röka efter midnatt dygnet före undersökningen

Dagarna före undersökningen får du inte använda salicylsyrepreparat (Magnecyl, Albyl, Treo m fl) eller liknande värktabletter (Naprosyn, Voltarén, Brufén m fl). Orsaken är att dessa ökar risken för blödning under undersökningen. Tillåtna värktabletter är bland annat Alvedon, Panodil, Dexofen och Citodon.

Strax före undersökningen får du läkemedel som är lugnande och du får andas in lokalbedövning.

Efter undersökningen

Du vilar och är fastande i 4 timmar.

Du får inte köra bil efter undersökningen. Ordna därför transport på annat sätt.