

Rutin
Process: 3.1.1 RGK Tillhandahålla medicinsk service
Område: Provtagning och diagnostik
Giltig fr.o.m: 2018-04-02
Giltig t.o.m: 2023-12-20 00:00:00
Faktaägare: Madeleine Karlsson, Sektionsledare Ultraljud
Fastställd av: Peter Kidron, Sektionsansvarig läkare Thorax
Revisions nr: 2
Identifierare: 117522



Ultraljudsundersökning ascites - percutant dränage

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Röntgenheten Växjö

Faktaägare 2: Peter Kidron, sektionsansvarig läkare thorax

Metod

Undersökningen görs liggande och tar ca 40 minuter (ingreppet 10 minuter).
Utförs av läkare. Kontaktgel används.
Aktuellt område tvättas med klorhexidinsprit och ”kläs in” med sterila dukar.
Punktionstället lokalbedövas med xylocain. Dränage anläggs med one-step teknik och vätska/var leds ut via drän till en påkopplad påse.

Indikation

Dränering av bukvätska.

Kontraindikation

Antikogulationsbehandling.

[Utsättning av läkemedel som påverkar hemostasen inför interventionella ingrep vid Röntgen Kronoberg](#)

Remissinformation

Klinisk information av remittent.
Eventuell antikogulationsbehandling.

Patientförberedelser

Inneliggande.
Fastande 4 timmar.
Fungerande pvk eller picc-line, subucutan venport.
Blödningsprover PK, APTT,TPK. Antikogulationsbehandling?
Premedicinering ges av avdelningen.
Eventuella prover tar avdelningen själva från dränet.

Giltig fr.o.m: 2018-04-02

Giltig t.o.m: 2023-12-20 00:00:00

Identifierare: 117522

Ultraljudsundersökning ascites - percutant dränage



Eftervård

Sängläge 4 timmar efter undersökning.

Kontroll av puls och blodtryck.

Uppföljning

Rutinen följs upp vartannat år eller vid behov.

Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	
1	Kopia	

Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring