

## Lokalanestetika maxdoser vuxna, OPE Växjö och Ljungby

**Gäller för:** Anestesikliniken

**Utförs på:** Operationsenheten Ljungby, Operationsenheten Växjö

**Faktaägare:** Birgitta Berg, läkemedelsansvarig sjuksköterska, operationsenheten Ljungby, Fredrik Kullberg, överläkare, operationsenheten Växjö

### Lokalanestetika – maxdoser hos vuxna

Läkemedel	Styrka mg/ml	Maxdos	Max mängd i ml om 70kg	Max dos mg/70kg över tid
Marcain (bupivacain)	2,5mg	2mg/kg*	60	150mg/4tim 400mg/24tim
	5,0mg		30	
Marcain- Adrenalin (bupivacain)	2,5mg+5µg/ml	2mg/kg*	60	150mg/4tim 400mg/24tim
	5,0mg +5µg/ml		30	
Carbocain (mepivakain)	10mg	5mg/kg*	35	350mg/4tim
	20mg		17,5	
Carbocain- Adrenalin (mepivakain)	5mg+5 µg/ml	5mg/kg*	70	300mg/4tim  För EDA rekommenderas max 15ml av någon lösning pga förekomst av konserveringsmedel
	10mg+5µg/ml		35	
	20mg+5µg/ml		15-20	
Ropivacain (Narop)	2,0mg	3mg/kg*		280mg/4tim  800mg/24tim
	5,0mg			

Giltig fr.o.m: 2018-11-22

Giltig t.o.m: 2022-10-16

Identifierare: 117582

Lokalanestetika maxdoser vuxna, OPE Växjö och Ljungby



	7,5mg 10mg			
Citanest (Prilocain)	5,0mg	5mg/kg**	70	350mg/tim

\* Hos patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion ska upprepade doser reduceras.

\*\* Intravenös *regional anesthesi*: Dosen ska reduceras till patienter med nedsatt allmäntillstånd.