

Enbrel/Benepali® patientinformation

Förväntad effekt av Enbrel/Benepali

Enbrel/Benepali dämpar inflammationen som förekommer vid reumatiska sjukdomar. Den aktiva substansen, etanercept, är ett biologiskt läkemedel som binder till ett specifikt protein (TNF- α) som finns i förhöjda nivåer vid reumatiska sjukdomar.

Dosering

Enbrel/Benepali tas som en injektion under huden enligt ordination. Instruktion om hur Enbrel/Benepali injiceras finns bifogat i förpackningen.

Förvaring

Enbrel/Benepali ska förvaras i kylskåp 2-8°C, men får inte frysas.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna med Enbrel/Benepali är milda reaktioner på eller runt injektionsstället, till exempel klåda, ömhet, rodnad, blödning, blåmärken, svullnad eller smärta. Andra biverkningar som kan uppträda vid användning av Enbrel/Benepali är:

- infektioner
- huvudvärk
- snuva
- hudutslag, nässelfeber, klåda
- magont, diarré
- tilltagande hosta
- svaghetskänsla
- smärta
- ytliga blåmärken, munsår och håravfall.

Kontakta alltid din läkare/sjuksköterska om någon av dessa skulle uppkomma.

Uppföljning

För att säkerställa att inga oönskade effekter av Enbrel/Benepali uppkommer så kommer blodprov kontrolleras regelbundet.

Graviditet och amning

Det är inte känt hur Enbrel/Benepali påverkar under graviditet och amning. Därför rekommenderas inte användning av Enbrel/Benepali till gravida. Fertila kvinnor bör rådas att inte bli gravida under behandling med Enbrel/Benepali.

Samtidig behandling med andra läkemedel

Berätta alltid för läkare/tandläkare att du är insatt på Enbrel/Benepali. Samtidig behandling med Enbrel/Benepali och andra läkemedel/naturläkemedel kan ibland ge oönskade effekter. Diskutera med din läkare eller sjuksköterska vilka läkemedel du bör undvika.

Om du behöver behandlas med antibiotika så bör du kontakta mottagningen för rådgivning om eventuellt uppehåll av medicineringen.

Övrigt

Enbrel/Benepali ska inte användas under pågående infektion som till exempel övre luftvägsinfektion, infekterade sår eller urinvägsinfektion. Rådgör med din mottagning om du känner dig osäker.

Inför planerade operationer/ingrepp kontaktas mottagningen för rådgivning och eventuellt uppehåll av medicineringen.

Om du ska vaccinera dig så bör du rådfråga din läkare.

Undvik opastöriserade mjölkprodukter då det kan orsaka allvarlig infektion av bakterien Listeria.

Vissa uppgifter i den information som följer läkemedlet från apoteket gäller behandling av andra sjukdomar och med andra doser. Därför kan de inte direkt överföras på din behandling och din situation.