

**Rutin**

**Process:** 3 RGK Hälsa, vård och tandvård

**Område:** Läkemedel och vätskebehandling

**Giltig fr.o.m:** 2018-05-01

**Giltig t.o.m:** 2023-05-31 00:00:00

**Faktaägare:** Andreas Gårin, Överläkare Barn- och Ungdomskliniken

**Fastställd av:** Anna Bårtås, verksamhetschef Barn- och Ungdomskliniken

**Revisions nr:** 2

**Identifierare:** 117647

## Morfinhydroklorid

Gäller för: Barn- och ungdomskliniken

<b>Preparat</b>	Morfin 1 mg/ml
<b>Spädes</b>	1 ml Morfinhydroklorid 1 mg/ml spädes med 9 ml glucos 5%
<b>Koncentrationen blir</b>	100 mikrogram/ml
<b>Dosering</b>	5-20 mikrogram /kg/timme
<b>Adminstrationssätt</b>	Kontinuerlig infusion
<b>Administrationstid</b>	<b>Kontinuerlig infusion</b>  Neonatalperioden vanligen 5-10 mikrogram/kg/tim  Barn över 1 månad 10-20 mikrogram/kg/tim
<b>Hållbarhet</b>	Blandas och byts var 12:e timme

Källa:

Läkemedel Neonatalkliniken SUS

[www.eped.se](http://www.eped.se) sll Neo

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare**