

Klorokinfosfat®/Plaquenil®, patientinformation

Förväntad effekt av Klorokinfosfat/Plaquenil

Medicinen dämpar sjukdomens inflammatoriska aktivitet, vilket innebär att symtom som stelhet, värk, ledsvullnad och trötthet minskar.

Effekten inträder långsamt efter 2 – 3 månaders behandling, ibland upp till 6 månader.

Dosering

Tabletten tas 1 gång dagligen och kan tas med eller utan mat.

Vid ledgångsreumatism och SLE anpassas dosen Klorokinfosfat/Plaquenil efter hur mycket man väger.

Biverkningar

- huvudvärk
- övergående illamående och aptitlöshet
- yrsel och sömnstörningar
- hudutslag, klåda och pigmentförändringar
- synpåverkan kan förekomma ibland men är en ofarlig och oftast övergående biverkan

Känslighet för solen ökar och det finns ökad risk för utslag eller solexem om man solbadar. Använd solglasögon vid starkt solljus och använd hög solskyddsfaktor. Vissa patienter rekommenderas att göra uppehåll under sommarmånaderna.

Kontakta mottagningen om du upplever biverkningar.

Uppföljning

Klorokinfosfat/Plaquenil kräver inga regelbundna blodprovskontroller.

Graviditet och amning

Rådgör med din läkare om du planerar att bli gravid, är gravid eller ammar.

Samtidig behandling med andra läkemedel

Berätta alltid för läkare/tandläkare att du är insatt på Klorokinfosfat/Plaquenil. Samtidig behandling med Klorokinfosfat/Plaquenil och andra läkemedel/naturläkemedel kan ibland ge oönskade effekter. Diskutera med din läkare eller sjuksköterska vilka läkemedel du bör undvika.

Övrigt

Om du ska vaccinera dig bör du rådfråga din läkare.

Vissa uppgifter i den information som följer läkemedlet från apoteket gäller behandling av andra sjukdomar och med andra doser. Därför kan de inte direkt överföras på din behandling och din situation.