

Metoject®, patientinformation

Förväntade effekt av Metoject

Metoject dämpar inflammationen som förekommer vid reumatiska sjukdomar. Effekten kommer långsamt. Som regel märker man inte någon skillnad förrän efter cirka 6 veckor.

Dosering

Man tar Metoject injektionen en gång per vecka, tid på dygnet spelar ingen roll.

Biverkningar

I sällsynta fall kan Metoject ge biverkningar. De flesta biverkningar är ofarliga och övergående men i mycket sällsynta fall kan de vara allvarliga. Det är därför viktigt att du är observant på följande symtom och så fort som möjligt tar kontakt med din behandlande läkare eller sjuksköterska om någon av följande biverkningar skulle uppkomma.

- illamående
- sveda i munnen eller på tungan
- klåda och utslag
- hostretning, andnöd, feber

Metoject kan påverka mottagligheten för infektioner. Om du drabbas av infektion och/eller hög feber bör du ta kontakt med din mottagning.

Uppföljning

För att säkerställa att inga oönskade effekter av Metoject uppkommer så kommer blodprov kontrolleras regelbundet.

Alkohol

När du behandlas med Metoject finns en ökad risk för leverpåverkan om man dricker mycket alkohol. Alkohol bör därför undvikas.

Graviditet och amning

Metoject har oönskade effekter på foster samt på ägg och spermier. Graviditet i samband med att man behandlas med Metoject ska alltid undvikas, både för män och kvinnor. Detta gäller ända upp till 6 månader efter avslutad behandling.

Samtidig behandling med andra läkemedel

Berätta alltid för läkare/tandläkare att du är insatt på Metoject. Samtidig behandling med Metoject och andra läkemedel/naturläkemedel kan ibland ge oönskade effekter. Diskutera med din läkare eller sköterska vilka läkemedel du bör undvika.

Om du behöver behandlas med antibiotika så bör du kontakta mottagningen för rådgivning om eventuellt uppehåll av medicineringen.

Inför planerade operationer/ingrepp kontaktas mottagningen för rådgivning och eventuellt uppehåll av medicineringen.

Om du ska vaccinera dig så bör du rådfråga din läkare.

Vissa uppgifter i den information som följer läkemedlet från apoteket gäller behandling av andra sjukdomar och med andra doser. Därför kan de inte direkt överföras på din behandling och din situation.