

Efedrin - Efedrin anestesi-ssk ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Efedrin, injektionsvätska (50 mg/ml)

Indikationer

- Hypotension i samband med anestesi

Kontraindikationer

- I detta sammanhang endast överkänslighet

Dosering

Vuxen

- Ge **Efedrin (50mg/ml), 0,1-0,2ml i.v.** Kan upprepas vid behov till totalt 1ml. Därefter kontaktas narkosläkare.

Barn

- Ge **Efedrin (50mg/ml), 0,3mg/kg i.v.** Vid administrering till barn ska narkosläkare kontaktas!

Försiktighet

- Används med försiktighet vid patienter med ischemisk hjärtsjukdom, hypertoni och arytmier

Biverkningar

- Takykardi
- Tremor

Speciellt att tänka på

- **Får endast användas av anesthesiutbildad personal!**
- Hypotension ofta beror på hypovolemi
- Kontakta narkosläkare frikostigt vid cirkulatoriskt instabila patienter

Giltig fr.o.m: 2019-01-31
Giltig t.o.m: 2021-10-31
Identifierare: 117784
Efedrin - Efedrin anesthesi-ssk ambulansverksamheten

