

Fenylefrin - Fenylefrin Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Fenylefrin, injektionsvätska (0,1 mg/ml)

Ren alfa-agonist

Indikationer

- Hypotension i samband med anestesi

Kontraindikationer

- På ovanstående indikation endast överkänslighet

Dosering

Vuxen

- Ge **Fenylefrin (0,1mg/ml)**, 0,5-1ml i.v. Kan upprepas vid behov till totalt 5ml, därefter kontaktas narkosläkare för fortsatt ordination

Barn

- Ge **Fenylefrin (0,1mg/ml)** 0,5-1 µg/kg i.v. Vid administrering till barn ska narkosläkare kontaktas!

Försiktighet

- Bradykardi, ischemisk hjärtsjukdom, hypertoni

Biverkningar

- Hypertension
- Arytmier, reflektorisk bradykardi (svarar på atropin)
- Lokal ischemi
- Förvirring
- Ångest, oro, tremor

Giltig fr.o.m: 2019-01-31

Giltig t.o.m: 2021-10-31

Identifierare: 117794

Fenylefrin - Fenylefrin Ambulansverksamheten



Speciellt att tänka på

- **Får endast användas av anesthesiutbildad personal!**
- Verkar selektivt på alfa-1-receptorer -> vasokonstriktion -> blodtrycksstegring
- Ingen effekt beta-receptorer -> ingen inotrop eller kronotrop effekt. Detta innebär risk för minskad cardiac output, hjärtsvikt och lungödem
- Kontakta narkosläkare frikostigt vid cirkulatoriskt instabila patienter