

Roccuronium - Rokuronium Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Rokuronium, lösning (10 mg/ml)

Indikationer

- Muskelrelaxation inför intubation samt vid respirator behandling. (Får endast ges efter kontakt med narkosläkare)

Kontraindikationer

- Överkänslighet mot **rokuronium** eller **bromid**

Dosering

Vuxen och barn

- Ge **inj. Rokuronium (10mg/ml)**,
 - **Standardintubation: Rokuronium (10 mg/ml)** 0,6 mg/kg i.v. (effektduration ca 30-60min)
 - **RSI: Rokuronium (10 mg/ml)** 1,2 mg/kg i.v.
 - **Underhållsdosering: Rokuronium (10mg/ml)** 0,1-0,15 mg/kg i.v.

Försiktighet

- Vid användning av Rocuronium måste utrustning för ventilation finnas tillgänglig
- Ge inte om risk för intubationssvårigheter föreligger

Biverkningar

- Anafylaktisk reaktion
- Takykardi
- Hypotoni

Överdoser

-

Speciellt att tänka på

- **Får endast användas av anesthesiutbildad personal efter kontakt med narkosläkare**
- Användaren bör behärska alternativ luftvägshantering samt kirurgisk koniotomi
- Doseringen beräknas enligt patientens idealvikt (förenklat: kroppslängden i cm minus 105 för kvinnor och minus 100 för män)
- TOF-stimulering bör utföras innan patienten extuberas.
- Myastenia gravis eller liknande neuromuskulär sjukdom ger **rokuronium** kraftigare effekt med längre duration.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare