

**Rutin****Process:** 3 RGK Hälsa, vård och tandvård**Område:** Läkemedel och vätskebehandling**Giltig fr.o.m:** 2018-05-01**Giltig t.o.m:** 2023-05-31 00:00:00**Faktaägare:** Andreas Gårlin, Överläkare Barn- och Ungdomskliniken**Fastställd av:** Anna Bårtås, verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken**Revisions nr:** 2**Identifierare:** 117849

## Regitine

Gäller för: Barn- och ungdomskliniken

<b>Preparat</b>	Regitine 10 mg/ml
<b>Indikation</b>	Vid accidentiell extravasal injektion av Dopamin, Dobutamin, Noradrenalin eller Ca++
<b>Spädning</b>	1 ampull (å 1ml) Regitine 10mg/ml spädes med 19 ml NaCl 9 mg/ml
<b>Koncentrationen blir</b>	0,5 mg/ml
<b>Dosering</b>	1 ml Regitine 0,5 mg/ml injiceras subcutant/lokalt delat på 5 injektioner, givna från olika håll och i tät följd.  Byt nål mellan injektionerna
<b>Adminstrations sätt</b>	Regitine ges på platsen där droppet gått extravasalt
<b>Hållbarhet</b>	Överbliven lösning kasseras

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare