

Pt-lohexolclearance på dialyspatient

Efter dialys:

- Lägg upp ett provtagningsunderlag i Cosmic.
- Tag förprov, Pt-lohexolclearance, 2 st rör.
- Ge Omnipaque (ordineras i Cosmic), spola efter med NaCl.
Dosering vanligtvis inj Omnipaque 300 mg I/ml, 5 ml iv.
Patient med vikt under 40 kg ges 3 ml.
- Under *Medicinsk information* i provtagningsunderlaget anges:
 - Injektionsvolym
 - Omnipaquekoncentration
 - Tidpunkt för: förprov, injektion och efterprov
 - Vikt
 - Längd
- Lämna ner provet utan att skicka provtagningsunderlaget.
Provtagningsunderlaget skickas först när efterprovet är taget.

Nästkommande dialys:

- Tag efterprov före dialysbehandlingen, 2 st rör.
- Fyll i aktuella uppgifter under Medicinsk information enligt ovan.
- Lämna ner prov och skicka provtagningsunderlaget som gäller för både för- och efterprov.

Speciell omvårdnad:

Jodöverkänslighet, ex tål inte joderat salt eller skaldjur, undersökning ska ej genomföras.

Patienten ska observeras under 30 minuter efter given injektion med kontroll av blodtryck och puls innan hemgång.