

## Läkemedel och infusionsaggregat IVA Växjö

Gäller för: Anestesi kliniken

Utförs på: Intensivvårdsavdelningen Växjö

Faktaägare: Ann-Sofie Jansson, sjuksköterska, Intensivvårdsavdelningen Växjö

Pia Törndahl, Läkemedelsenheten, Susanna Lundvall, Vårdhygien.

Hållbarhet och beredningstider		
<b>A</b>		
Adrenalin 1 mg/ml	12 mån i rumstemperatur	
<b>B</b>		
Blodtransfusionsaggregat	Max 4 tim.	Nytt aggregat om systemet stått stilla. Tänk rimligt antal påsar per aggregat då leverantör inte kan säga exakt antal.
<b>C</b>		
CeloCurin 50 mg/ml	2 mån i rumstemperatur.	
<b>E</b>		
EDA infusionsvätska - lagerberedd	<b>72 tim</b> – <a href="#">se läkemedelsblandningar IVA Växjö.</a>	Bupivacain/Sufentanil 1 mg/ml + 1 µg/ml -500 ml påse.  Ropivacain 2 mg/ml -200 ml påse.
EDA infusionsvätska – ssk-beredd	24 tim – <a href="#">se läkemedelsblandningar IVA Växjö.</a>	

Esmeron (Rocuronium) 10 mg/ml	3 mån i rumstemperatur.	
<b>I</b>		
Infusionsaggregat	3 dygn.  <b><u>1 dygn vid fettlösningar som Propofol eller Kabiven.</u></b>	
Infusionsaggregat till sprutpump	<u>3 dygn.</u>  <b><u>1 dygn vid fettlösning som Propofol.</u></b>	MicroClave till sprutan byts då aggregatet byts.
Infusioner <b>med</b> tillsats	24 tim.	Ex. Glukos med Na + K-tillsatser.
Infusioner <b>utan</b> tillsats	24 tim.	Ex Glukos, Ringer-Acetat, Plasmalyte
Insulin öppnad 10 ml ampull	7 dygn, förvaras mörkt i rumstemperatur.	Ex Humalog, Insulin Lispro Sanofi
Isoprenalina 0,2 mg/ml	6 mån i rumstemperatur.	
<b>K</b>		
Klorhexidinsprit öppnad flaska	1 mån.	Sprutpumpen byts vid flaskbyte.
<b>L</b>		
Läkemedel icke beredd eller beredd lösning till sprutpump	12-24 tim.	<a href="#">Se läkemedelsblandningar IVA Växjö.</a> OBS! Propofol, Ergenyl, Esomeorazol, Pentocur (tiopental), Pro-Epanutin
Läkemedel (i 1-20 ml spruta) till <b>intermittent</b> administrering	12 tim.	

<b>P</b>		
PCA aggregat	7 dygn.	
PCA infusionskassett	7 dygn.	

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.