

Entyvio - förberedelser och kontroller vid administrering

Gäller för: Medicinkliniken Växjö

Entyvio är ett biologiskt läkemedel för ulcerös kolit och crohns sjukdom. Till skillnad från andra biologiska läkemedel hämmar Entyvio inflammation selektivt i tarmen.

Förberedelser på magtarm-mottagningen:

Läkaren ger muntlig och skriftlig information om behandlingen och ordinerar Entyvio i läkemedelslistan i cosmic, rekommenderad dos 300 mg.

Infusionerna ges enligt följande intervall: Infusion nr 1 ges v. 0, infusion 2 ges v. 2, infusion nr 3 ges v. 6 och infusion nr 4 ges v. 14. Följande infusioner ges var 8:e vecka om inte läkaren ordinerar annat.

Behandlingsutvärdering sker tidigast efter 10 veckors behandling. Sjuksköterska på magtarm-mottagningen bokar in telefontid för uppföljning i v. 8 och återkopplar till medicinska dagsjukvården om fjärde infusionen ska ges tidigare (v. 10).

Läkare skriver remiss för lungröntgen om de bedömer att det behövs.

Kontrollera att tuberkulos samt hepatit A, B och C är uteslutet.

Kontrollera att rekommenderade vaccinationer är tagna före start.

Läkaren dikterar journalanteckning och ordinerar läkemedlet i cosmic.

Läkarsekreterare skickar messenger till medicinska dagsjukvårdens funktionsbrevlåda så att koordinatören bokar in patienten för start av behandling.

Förberedelser på medicinska dagvården

Koordinatören kontakter patienten per telefon och bokar in första och andra besöket. Muntlig information ges om dagsjukvårdens rutiner. Kallelse skickas hem.

Prover tas inför behandlingsstart (Gastro, Imurelprover, Med CLV = Blodstatus, S-Albumin, S-Calcium, S-Natrium, S-Kalium, S-Kreatinin, S-Bilirubin, S-ALP, S-GT, S-ASAT, S-ALAT, S-LD, S-CRP, S-Pankreasamylas, B-SR).

På behandlingsdagen:

På behandlingsdagen kan sjuksköterskan starta infusionen efter att patientens frågeformulär, ”Remicade®, frågeformulär till patienten på behandlingsdagen”, gått igenom och bedömts vara utan anmärkning. Vid vartannat infusionstillfälle ska även enkäten ”Livskvalitet och sjukdomsupplevelse” (för respektive diagnos) fyllas i.

Sjuksköterskan skickar messenger till magtarm-mottagningen för att informera om behandlingsstart vid första infusionstillfället och då bokar sjuksköterska på magtarm-mottagningen in telefontid i v. 8 för utvärdering.

Patienten tillfrågas om hur denne mått sedan förra behandlingen och om någon reaktion på förra infusionen uppstått.

Prover efter behandlingstart tas vid vartannat infusionstillfälle, men svar behöver inte inväntas innan infusionen startas.

Vikt tas inför behandlingsstart samt vid försämring av sjukdom.

Temp, puls och blodtryck kontrolleras inför varje infusion.

Entyvio bereds och administreras enligt produktresumé för Entyvio.

Under infusionen bör man hålla patienten under uppsikt med avseende infusionsreaktioner. Patienterna bör informeras om tidiga tecken på dessa reaktioner, så att de själva kan vara observanta på dessa och meddela sjuksköterskan (eller annan tillgänglig vårdpersonal) i tid.

Efter de två första infusionerna kvarstannar patienten 2 h för observation. Efter tredje infusionen kvarstannar patienten 1 h. Om den fjärde infusionen ges utan anmärkning kan patienten gå hem direkt efter avslutad infusion.

Pvk:n bör sitta kvar tills patienten lämnar medicinska dagvården.

Tid för nästa besök bokas in och kallelse skickas med patienten.

[Länk till åtgärdsschema vid allergisk reaktion i samband med Remicade-infusion.](#)