

**Riktlinje**

**Process:** 3.3.0 RGK Leda, styra och organisera

**Område:** Palliation

**Giltig fr.o.m:** 2021-12-01

**Giltig t.o.m:** 2023-11-30

**Faktaägare:** Anders Lindgaard Andersen, överläkare, anestesikliniken

**Fastställt av:** Katarina Planhammar Hörberg, verksamhetschef, onkologkliniken

**Revisions nr:** 2

**Identifierare:** 150419



## Behandlingsschema för Propofol vid palliativ sedering

**Gäller för:** Onkologkliniken

**Utförs på:** Onkologkliniken

Den Propofol vi använder levereras som koncentrerad beredning på **10 mg/ml** i flaskor om 100 ml.

Ges intravenöst med infusionspump och byts var 12:e timma. Ordination och dositering av specialistkompetent läkare.

### Palliativ sedering

Man startar vanligen med **1 mg/kg/h**. Dosökning (eller sänkning) i steg om 0,5 mg/kg/h efter behov.

Försök anpassa doseringen till samtidigt givna opioider. Tänk också på att samtidig infusion av Midazolam kan behöva sänkas.

Giltig fr.o.m: 2021-12-01

Giltig t.o.m: 2023-11-30

Identifierare: 150419

Behandlingsschema för Propofol vid palliativ sedering



Datum															
Tid															
Patientens vikt															
Dos mg/kg/h															
Dos = ml/h															
Signatur läkare															
Signatur sköterska															
Sedering skattning (0-3)															
Byte dropp															

Skattning av sedering:

0=helt vaken, 1=trött, 2= sovande, men väckbar, 3= djup sömn.