

Läkemedel vid hemgång för cancerpatienter

- Injektion Klexane förfylld spruta 100mg/ml 0,4ml = 40mg: 0,4ml 1ggr dagligen.
- Smof Kabiven infusion emulsion: 1100kcal, 986 ml 3ggr per vecka.
- Natriumklorid infusion 9mg/ml: 1000ml ges under natten, parallellt med Smof Kabiven, 3ggr per vecka.
- Glucos infusion 50mg/ml med Na 40 + K 20 eller Glukos-EI 100mg/ml: 1000ml dagligen, samt de 4 dyggen/vecka då Smof Kabiven ej ges ytterligare 1000ml.
- Addaven infusionskoncentrat lösning: 10ml varannan dag. Tillsättes till Smof Kabiven.
- Vitalipid Adult infusionskoncentrat, emulsion: 10ml varannan dag. Tillsättes till Smof Kabiven.
- Soluvit pulver till infusionsvätska: 1 flaska varannan dag. Tillsättes till Smof Kabiven.
- Klorhexidinsprit kutan lösning 5mg/ml: utvärtes 250ml. Rengöring av hud.
- Fentanyl depotplåster.....mikrogram/timme: 1plåster var 3:e dag.
- Paracetamol infusion 10mg/ml: 100ml/ 30minuter (200,0ml/timme)
- Natriumklorid injektion lösning 9mg/ml: 50ml plastbehållare. För genomspolning av SVP, Picceline.
- Eventuellt skrivs och så VILS läkemedel i läkemedelslistan.

Så här söker man VILS läkemedel: Gå in på läkemedels lista

Ny

Sök sedan på VILS

OBS! Glöm inte att ordinera administrations sätt dvs s.c, im och iv.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare