

## Ethambutolbehandling - kontroller vid

**Gäller för:** Ögonkliniken  
**Faktaägare:** Karin Ylvén  
Cristin Holm

Ethambutol är ett läkemedel som används vid behandling av tbc, ingår i **Myambutol** och även Rimstar.

Kontroller rekommenderas under behandling pga risk för opticusneuropati/**opticusneurit**, den uppkommer tidigast efter 2 mån:s behandling. Den är **ovanlig**, men viktigt att pat informeras och **genast rapporterar av synstörningar!**

- **Central påverkan** med FS-defekt (oftast blå-gul)
  - Synnedsättnin
  - Synfältsdefekter
- **Perifer påverkan** med FS-defekt (röd-grön)
  - Bevarat visus
  - Perifera SF-defekter (ff a bitemporala)

Vid minsta påverkan på funktionen som konstateras ska **Ethambutol utsättas!** Visusförbättring i cirka 50-60%, förbättrades SF i 75-80%.

### 1.1 Rutiner:

- 1) Remiss från infektionsklin.
- 2) VL usk/ssk för:
  - \* **Visus**
  - \* **FSF** enl BK, om BK defekt gör även SST
  - \* **Närvisus**
- 3) Första kontroll vid behandlingsstart och sedan varje månad efter insatt behandling.
- 4) VL usk/ssk för:
  - \* **Visus**
  - \* **FSF** enl BK, om BK defekt gör även SST
  - \* **Närvisus**
- 5) Lämpligen får pat vid besöket tiden för nästa kontroll.

Om förlängd behandlingstid (>6-12 mån) kan vid normala resultat kontrolltiden glesas ut till varannan mån. Vid patologiska resultat göres snarast **läkarbedömning:** Synfält (Goldmann eller Humphrey 30-2), OCT, utsättning av Ethambutolk skall övervägas (se ovan). Infektionskliniken kontaktas. Resultaten till Cristin Holm eller annan ansvarig läkare.

PM SUS.