

Gynekologiskt cellprov, avvikande provsvar dysplasibarnmorska

Gäller för: Kvinnokliniken

Kvinnor 23-27 år Flödesschema 1 Primärscreening cytologi (Reflextest HPV vid avvikelse)	Åtgärd
ASCUS/LSIL / HPV negativ	Åter till GCK (3 år)
ASCUS/LSIL / HPV positiv	Nytt cytologprov utan HPV hos barnmorska inom 4 månader efter indexprovet. Om cytologprov är avvikande till kolposkopi inom 6 månader efter indexprovet. Vid normalt cytologprov, men bärare av HPV 16/18 på indexprovet, till ny dubbelanalys om 18 månader. Övrigt högrisk-HPV på indexprovet åter GCK.
HSIL/ASC-H oavsett HPV	Kolposkopi inom 3 månader från indexprovet. Reflextest HPV.
Kvinnor 28-29 år Flödesschema 1 (Reflextest HPV vid avvikelse)	Åtgärd
ASCUS/LSIL / HPV negativ	Åter till GCK (3 år)
ASCUS/LSIL / HPV positiv	Kolposkopi inom 3-4 månader från indexprovet
HSIL/ASC-H oavsett HPV	Kolposkopi inom 3 månader från indexprovet. Reflextest HPV.

Kvinnor 30-70 år Flödesschema 2 Primärscreening HPV. (Reflextest cytologi vid avvikelse)	Åtgärd
HPV positiv/cytologi negativ	Kontrollfil HPV via GCK: HPV 16/18: Åter efter 18 månader HPV övrig högrisk: Åter efter 3 år ↓ HPV negativ efter kontroll: åter till GCK HPV positiv: Kolposkopi inom 3 månader
HPV positiv/cytologi positiv	Till kolposkopi och cytologprov inom 3 mån från indexprovet

Kvinnor 40 år Flödesschema 3 (Primärscreening cytologi + HPV)	Åtgärd
Cytologi positiv oavsett HPV status	Kolposkopi inom 3 månader
HPV positiv/cytologi negativ	Kontrollfil HPV via GCK: HPV 16/18: Åter efter 18 månader HPV övrig högrisk: Åter efter 3 år ↓ HPV negativ efter kontroll: åter till GCK HPV positiv: Kolposkopi inom 3 månader
HPV negativ/cytologi negativ	Åter GCK

Gravida kvinnor

Gravida kvinnor	Åtgärd
Misstanke om skivepitelcancer, adenocarcinom in situ/ misstanke om adenocarcinom	Kolposkopi snarast
All avvikande cytologi förutom ASCUS/LSIL utan HPV	Kolposkopi skyndsamt efter graviditetsvecka 12
ASCUS/LSIL utan HPV	Handläggs som icke gravida
Negativ cytologi, positiv HPV	Kontrollfil HPV via GCK, enligt riktlinjer för icke gravida
Ej bedömbart prov	Nytt prov skyndsamt efter behandling av eventuell infektion

Endocervikalceller saknas, normal cellprov	Åtgärd
För kvinnor utan tidigare cellförändringar	Ingen åtgärd
För kvinnor i kontrollfil efter behandling	Första gången- Nytt cytologprov Andra gången- Kolposkopi inom 3 mån
Misstanke om skivepitelcancer, adenocarcinom in situ/ misstanke om adenocarcinom	Kolposkopi snarast
Körtelcellsatypi, oklar cellatypi	Kolposkopi inom 3 månader
Ej bedömbart prov	Första gången: Nytt cytologprov via GCK ↓ Andra gången: Till kolposkopi inom 3 månader
HPV självtest	HPV neg: åter GCK HPV pos: Kolposkopi inom 3 månader

Giltig fr.o.m: 2020-02-20

Giltig t.o.m: 2022-02-20

Identifierare: 152070

Gynekologiskt cellprov, avvikande provsvar dysplasibarnmorska



Övriga grupper

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare