

Inläggning av bröstprotes

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Operationsenheten Växjö

Faktaägare: Ulla Svanström, narkossköterska, Lennart Löf, narkosläkare, operationsenheten Växjö

Innehållsförteckning

Inläggning av bröstprotes	1
1 Ingrepp	2
2 Indikation	2
3 Preoperativa förberedelser	2
3.1 Patient:	2
3.2 Anestesi:	2
3.3 Operation:	2
4 Position	3
5 Utrustning	3
6 Hygien	3
7 Elimination	3
8 Anestesi	3
8.1 Utförande	3
9 Läkemedel övriga	3
10 Steril utrustning	3
11 Preparathantering	3
12 Peroperativ vård	3
13 Särskilda observanda	4
13.1 Anestesigång:	4
13.2 Operationsgång:	4
13.3 Särskilda observanda	4
14 Postop	4
14.1 Mobilisering	4
14.2 Hud	4
14.3 Postoperativa hjälpmedel	4

14.4 Information till patienten.....4

1 Ingrepp

Inläggning av bröstprotes

2 Indikation

Rekonstruktion i samband med eller efter bröstcanceroperation

Medfödda missbildningar

Byte av protes

3 Preoperativa förberedelser

3.1 Patient:

Patienten opereras dagkirurgiskt eller slutenvårds.

- Kontroll enligt WHO:s checklista för säker kirurgi.
- [Akuta operationer-rutiner och prioriteringar](#)
- [Preoperativa rutiner för slutenvårds- och dagkirurgiska patienter](#)
- [Preoperativa undersökningar inför operation på anestesikliniken](#)
- [Premedicinering av vuxna inför operation](#)
- [Preoperativ helkroppsdusch och hårkortning](#)- lokala riktlinjer.
- [Preoperativa åtgärder för att undvika förväxlingar i samband med operativa ingrepp](#)
- [Trombosprofylax](#)
- [Preoperativ blodprovstagning](#)
- [Antibiotikapofylax](#)
- Noggrann [trycksårsprofylax](#).
- Skall prova ut och ha på sig en special-BH samt en extra BH med hem vid utskrivning.
- Kontroll av legitimation.
- Id-märkning

3.2 Anestesi:

- Följ rutiner för att förebygga [perioperativ hypotermi](#).
- Kontrollera att alla läkemedel samt övrig utrustning finns förberett på salen. Undvik onödigt öppnande av dörrar peroperativt med avseende på kontaminationsrisken.
- **Blodgruppering: Ja**
- **Bastest: Nej**
- Blodtryck och PVK i motsatt sida alternativt underben.
- Noggrann [trycksårsprofylax](#).

3.3 Operation:

- Kontrollera att det på operationsavdelningen finns aktuell protes i två exemplar samt ett TGR-Nät.

4 Position

Se bilder: G:\Ane\Centralop\Omv_riktlinjer\PLATINA\Kirurgsektionen\Uppläggningsbilder
Kirurgsektionen

- Ryggläge med båda armarna på armbord.
- Kuddar i knäveck, samt hälskydd, rem över benen.
- Benpåsar
- Assistenten står ovanför armen på den sida som skall opereras.
- Ibland får man perioperativt ”sätta patienten upp” för att kontrollera att det blir jämnt fördelat.

5 Utrustning

- Diatermi
- Baerhugger
- Ranger vätskevärmare

6 Hygien

Mössa– hjälmmodellen samt munskydd.

- Slussning på salen, stängda dörrar.
- [Personalföreskrifter för operationsavdelning – Vårdhandboken](#)
- [Arbetsklädsel- lokala anvisningar](#)

7 Elimination

- Bladderscan före anestesistart samt efter avslutad operation enligt riktlinjer.
Urintappning vid behov.
- [Övervakning av urinblåsa i samband med operation-vuxna patienter](#) – lokala anvisningar

8 Anestesi

8.1 Utförande

- Generell anestesi
- I första hand total intravenös anestesi

9 Läkemedel övriga

10 Steril utrustning

G:\Ane\Centralop\Omv_riktlinjer\Operation\Kirurgi\Bröst,Endokrin\Instrumentlistor.

11 Preparathantering

[Länk](#)

12 Peroperativ vård

[Peroperativ vård](#) – Vårdhandboken

13 Särskilda observanda

13.1 Anestesigång:

- Noggrann [trycksårsprofylax](#).
- Minst 1 PVK.
- [Antibiotikaprofylax enligt riktlinje](#), hela dosen skall ha givits före knivstart!
- BH och eventuellt bröstband ska sättas på plats före väckning!

13.2 Operationsgång:

-

13.3 Särskilda observanda

- Viktigt att antibiotika har givits före knivstart.
- BH och eventuellt bröstband ska sättas på plats före väckning!

14 Postop

[Generell Vårdplan Postop](#)

14.1 Mobilisering

Patienten får information på bröstmottagningen om mobilisering.

- Under 6 veckor postoperativt undvika tunga lyft och rörelser där det stramar över bröstkorgsväggen.
- Inte höja armbågarna ovan axelnivå under tre veckor.

14.2 Hud

Förband ska sitta kvar i 7 dagar, steristrips i 14 dagar.

14.3 Postoperativa hjälpmedel

Får BH som ska användas som stöd de första veckorna, se patientinformationsblad.

Bröstband för att hjälpa till att hålla proteserna fixerade. Det ska sitta på dygnet runt i 3 veckor (kan tas av vid dusch).

14.4 Information till patienten

Läkarsamtal

Återbesök till bröstmottagningen.

Patientbroschyr operation inläggning av bröstprotes.

Informera om att kontakta bröstsjuksköterskan på kirurgmottagningen vid eventuella frågor eller besvär.

Vid akuta besvär kväll och natt kontakta 1177/akutmottagningen.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.