

## Läkemedelsblandningar operationsenheten Ljungby

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Operationsenheten Ljungby

Faktaägare: Birgitta Berg läkemedelsansvarig, operationsenheten Ljungby

### Infusioner/ Injektioner

#### Läkemedel

Ciprofloxacin	Färdigspädd lösning	200mg 100ml Inf. 60 min.
	Färdigspädd lösning	400mg 200ml Inf. 60 min.
Cloxacillin	Blandning	2g i 100ml NaCl Inf. 20-30 min.
Dalacin/Clindamycin	Blandning	300mg i minst 50ml NaCl Inf. 10 min
	Blandning	600mg i minst 100ml NaCl Inf. 20 min.
Dridol/Droperidol Beredning 24h	Blandning Sprutmärkning	Dridol 2,5mg/ml i 9ml NaCl Dridol 0,25mg/ml
Dynastat Beredning 24h	Blandning	40mg i 2ml NaCl



<b>Eusaprim</b> (trimetoprim-sulfa)	Blandning	Inf.konc.16mg/ml+80mg/ml 10ml i 250 ml NaCl Inf.90 min.
<b>Fenylefrin</b> Beredning 24h	Sprutmärkning	Färdig blandning 0,1mg/ml
<b>Metronidazol</b>	Färdigspädd lösning	1,5g 300ml Inf. 40 min.
<b>Morfin</b> Beredning 24h	Blandning Sprutmärkning	Morfin 10mg/ml-1ml i 9ml NaCl Morfin 1mg/ml
<b>Noradrenalin</b> Beredningstid 24h *Ges med bärare vid perifer administrering	Blandning Sprutmärkning	4ml (1mg/ml) i 46 ml NaCl Noradrenalin 80µg/ml
<b>Omnipaque</b> Beredning 24h	Blandning Sprutmärkning	240mg/Iml-20ml späds med 20ml NaCl till koncentration 120mg/Iml Omnipaque.
<b>OxyNorm/Oxykodon</b> Beredning 24h	Blandning Sprutmärkning	OxyNorm10mg/ml-1ml i 9mlNaCl OxyNorm 1mg/ml
<b>Propofol</b> Beredning 12h	Blandning Sprutmärkning	Färdig blandning 10mg/ml Propofol 10mg/ml
<b>Piperacillin/Tazobactam</b>	Blandning	2g 10ml Sterilt vatten Inj.3-5min
		4g 20ml Sterilt vatten Inj.3-5 min.
<b>Pentocur/Thiopental</b> Beredning 24h	Blandning Sprutmärkning	500mg i 20 ml Sterilt vatten Pentocur 25mg/ml
<b>Remifentanil</b> Beredning 24h	Blandning Sprutmärkning	Remifentanil 2mg+40ml NaCl Remifentanil 50µg/ml
<b>Remifentanil</b> Beredning 24h	Blandning Sprutmärkning	Remifentanil 1mg+20 ml NaCl Remifentanil 50µg/ml

Giltig fr.o.m: 2019-09-30

Giltig t.o.m: 2023-05-26

Identifierare: 158935

Läkemedelsblandningar operationsenheten Ljungby



REGION  
KRONOBERG

<b>Remifentanil</b> Beredning 24h	Blandning Sprutmärkning	Remifentanil 5mg+100 ml NaCl Remifentanil 50µg/ml
--------------------------------------	----------------------------	--

\*Vid Perifer administrering av Noradrenalin skall Ringer Acetat ges som "bärare", hastighet 50ml/h. påsen märks med "bärare", samt datum och klockslag. Noradrenalin och "bärare" ges i egen PVK med 10 cm slang med 3-vägs Kran. Kontrollera insticksstället 1ggr/tim för ischemi.

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.**