

Statraxen-Tranexamsyra Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Tranexamsyra, injektionsvätska 100mg/ml

Indikationer

- Stark klinisk misstanke på inre, icke kompressibel traumatisk blödning med eller utan cirkulatorisk påverkan (inom 3 timmar efter trauma)
- Stark klinisk misstanke om traumatisk hjärnblödning med påverkad medvetande (inom 3 timmar efter trauma)
- Allvarliga yttre blödningar i samband med trauma (inom 3 timmar efter trauma)
- Postpartumblödningar som överstiger 1000 ml
- Akuta GI-blödningar med cirkulatorisk påverkan

Kontraindikationer

- Om tid mellan händelsen och administration av tranexamsyran överstiger tre timmar så är administrationen kontraindicerad
- Överkänslighet mot tranexamsyra
- Bör undvikas inom 6 månader från trombotisk händelse, ska dock ges vid stor blödning ändå
- Barn mindre än 1 år

Biverkningar

- Kan orsaka illamående, kräkningar, blodtrycksfall och hudutslag efter för snabb infusion

Doser

Vuxen

- Ge inj. tranexamsyra 100mg/ml 1 g (=10 ml) i.v. eller i.o.

Ges långsamt, 1ml/min.

1g tranexamsyra kan också tillsättas till 100 ml NaCl 9 mg/ml för infusion på 10-15 min i.v. eller i.o.

Barn >1år

- Ge inj. tranexamsyra 100mg/ml 15mg/kg (=0,15 ml/kg) i.v. eller i.o.
Vikt kan avrundas till nästa heltal. Maximalt 1g ska ges.

Ges långsamt, 1ml/min.

Tranexamsyran kan också tillsättas till 100 ml NaCl 9 mg/ml för infusion på 10-15 min i.v. eller i.o.

Inj. tranexamsyra 100 mg/ml

Kroppsvikt (i kg)	10	20	30	40	50	>60
Milliliter Tranexamsyra	1,5	3	4,5	6	7,5	10

Speciellt att tänka på

- Under inga omständigheter får administrering av Tranexamsyra fördröja transport av patienten till sjukhus!
- Ska ges så tidigt som möjligt efter trauma

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare