

Kondylom

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Operationsenheten Växjö

Faktaägare: Kerstin Gustafsson sektionsansvarig gyn, operationsenheten Växjö, Eva Hagelberg undersköterska, Alexander Leptien överläkare, Anna Söderberg narkosköterska, operationsenheten Växjö

Innehållsförteckning

1	Ingrepp	2
2	Indikation	2
3	Preoperativa förberedelser.....	2
3.1	Patient:.....	2
3.2	Anestesi:.....	2
3.3	Operation:.....	2
4	Särskilda observanda.....	2
4.1	Anestesi.....	2
4.2	Operation.....	2
5	Position.....	3
6	Utrustning	3
7	Hygien.....	3
8	Elimination.....	3
9	Anestesi.....	3
10	Läkemedel övriga	3
11	Steril utrustning	3
12	Preparathantering.....	3
13	Peroperativ vård	3
14	Postop.....	4
14.1	Elimination.....	4

1 Ingrepp

Kondylom.

2 Indikation

Vårtor i underlivet eller kring ändtarmsöppningen vid kondylom. Vårtorna orsakas av ett virus som kallas HPV, humant papillomvirus.

3 Preoperativa förberedelser

3.1 Patient:

Patienten opereras dagkirurgiskt.

- Kontroll enligt WHO:s checklista för säker kirurgi.
- [Preoperativa rutiner för slutenvårds- och dagkirurgiska patienter](#)
- [Preoperativa undersökningar inför operation på anestesikliniken](#)
- [Akuta operationer-rutiner och prioriteringar](#)
- [Läkemedel i samband med operation](#)
- [Preoperativ helkroppsduch och hårkortning](#)
- [Preoperativa åtgärder för att undvika förväxlingar i samband med operativa ingrepp](#)
- Samtal med operatör samt eventuellt anestesilog.
- Kontroll av legitimation [Identitetskontroll - legitimering av patient](#)
- ID-märkning [Identifikation](#)
- Patienten ska kissa före operation.

3.2 Anestesi:

- Vidta nödvändiga profylaktiska åtgärder för att undvika peroperativ hypotermi, [Hypotermi – perioperativ profylax och behandling](#).
- [Svår toxisk reaktion av lokalbedövningsmedel](#)
- [Blodgruppering/bastest inför operation](#) – Kvinnokliniken Växjö.
- Blodgruppering: Nej.
- Bastest: Nej.

3.3 Operation:

- Benstöd och armstöd
- Munskydd FFP3 - Ref nr 1883.

4 Särskilda observanda

4.1 Anestesi

4.2 Operation

Kondylom som klipps, skrapas eller bränns bort. [Kondylom](#)

Använd munskydd 1883. [Personal föreskrifter för operations avdelning](#) – Vårdhandboken.

Taben med Xylocainsalva 5% som används vid operationens slut skickas med patienten hem.

5 Position

Uppläggning enligt **Arbetsrutin - uppläggning i benstöd på gyn sektionen.**

G:\Ane\Centralop\Omv_riktlinjer\PLATINA\Gynsektionen\Bildbibliotek_uppläggning_gyn.

- Ryggläge med benstöd
- Benpåsar
- Båda armarna ut
- Benstöd i max 2 timmar. [Operation med patient i benstöd](#)

6 Utrustning

- Bairhugger
- Sug och diatermi.

7 Hygien

- Munskydd FFP3 – Ref nr 1883.
- Mössa av hjälmmodell.
- Munskydd för all personal på en armlängds avstånd till operationsområdet.
- [Arbetskläder](#)- lokala anvisningar
- [Personalföreskrifter för operationsavdelning – Vårdhandboken.](#)
- [Hygienriktlinjer för operationssjukvård CLV/LL](#)

8 Elimination

- Bladderscan före anestesistart samt efter avslutad operation enligt riktlinjer.
- Urintappning eller kortids-KAD vid behov enligt ordination av anestesiläkare/operatör
- [Övervakning av urinblåsa i samband med operation-vuxna patienter](#) – lokala anvisningar.

9 Anestesi

- Propofolsedering med syrgasgrimma.
- Alternativt Generell anestesi med larynxmask.

10 Läkemedel övriga

[PONV profylax](#) – Lokala riktlinjer

- Xylocainsalva 5 % i operationssåret vid operationens slut.

11 Steril utrustning

Se omvårdnadsriktlinjer i pärm ”Gyn operationer” och på G-servern

(G:) /Ane /Centralop /Omv_riktlinjer /operation/Gyn_instrumentlistor/kondylom.

12 Preparathantering

[Provtagningsanvisningar patologi](#)

13 Peroperativ vård

[Peroperativ vård - vårdhandboken](#)

14 Postop

[Generell Vårdplan Postop](#)

14.1 Elimination.

Patienten ska kissa före hemgång

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare