

Biofosfonatbehandling av bröstcancer - riktlinjer och rutiner för patienter som inte ska ha annan onkologisk behandling.

Gäller för: Kirurgkliniken

Utförs på: Kirurgkliniken

Faktaägare: Johanna Björkman Överläkare Kirurgkliniken

Se aktuellt vårprogram. Dessa riktlinjer gäller inte patienter som får bisfosfonater på osteoporosindikation. De remitteras till primärvård för fortsatt behandling alternativt till osteoporosmottagningen.

Aktuella patienter

- Enbart postmenopausala
- Lymfkörtelpositiva där cytostatika inte är aktuellt
- Ingen övre åldersgräns; allmäntillstånd och möjlighet att genomföra behandlingen avgör
- Oberoende av ER status

Praktiskt utförande

- Zoledronsyra 4 mg iv var 6:e månad i 3 år som ges av kontaktsjuksköterska på bröstmottagningen. Ordinerar i Cosmic.
- Provtagning:
 - Före start: Kreatinin, S-calcium/ioniserat calcium. Ge kalcium/Dvitamin under pågående bisfosfonatbehandling
 - Från behandling nr 2: Kreatinin och S-calcium/ioniserat calcium i samband med behandling.
- Fråga om problem från tänderna. Vid behov utfärdas remiss till sjukhustandläkaren för genomgång och klartecken. Efter remissvar från sjukhustandläkaren kan patienten bokas in. Skicka messenger till sekreterare på bröststenheten.
- Recept på kalk och D vitamin (Calcipos D forte). Kan vänta att hämta ut tablettorna tills behandlingen börjar. Behandlingen fortsätter 3 mån efter sista behandlingen
- Start 1 månad postoperativt.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare