

Insulinordination vid intravenös insulinbehandling på avdelning 11 - Medicinsk rutin

På nyföddhetsavdelning används annan insulinspädning.

Var god se nästa sida.



Barn- och ungdomskliniken, avdelning 11

Insulinordination vid intravenös insulinbehandling, gäller **endast patienter på avdelning 11 utan ketoacidosis (pH > 7.30)**.

1 ml NovoRapid Penfill 100 E/ml blandas med 100 ml NaCl 9 mg/ml = NovoRapid 1 E/ml

På nyföddhetsavdelning används annan insulinspädning.

Eftersträva ett blodsockerfall på 2-3 mmol/timme.

Förslag till initial ordination (ändras vid otillräcklig/för snabbt blodsockerfall):

Datum: Kl: Läk.sign:

Ändrad ordination:

Datum: Kl: Läk.sign:

Ändrad ordination:

Datum: Kl: Läk.sign:

Patientvikt

Blodsocker	Doseringsförslag	Insulinordination ml/h	Blodsocker	Insulinordination ml/h	Blodsocker	Insulinordination ml/h
10 mmol/l	0,05 ml/kg/h	ml/h	>10 mmol/l	ml/h	>10 mmol/l	ml/h
5-10 mmol/l	0,025 ml/kg/h	ml/h	5-10 mmol/l	ml/h	5-10 mmol/l	ml/h
3-5 mmol/l	0,01 ml/kg/h	ml/h	3-5 mmol/l	ml/h	3-5 mmol/l	ml/h
<3 mmol/l	0 ml/kg/h/ utsättes	ml/h	<3 mmol/l	ml/h	<3 mmol/l	ml/h

Måltidsdoser

Doseringsförslag			
Huvudmål 0,10-0,15 ml/kg/h i 60 – 120 min	_____ ml/h i _____ min	_____ ml/h i _____ min	_____ ml/h i _____ min
Mellanmål 0,05-0,10 ml /kg/h i 60 minuter.	_____ ml/h i _____ min	_____ ml/h i _____ min	_____ ml/h i _____ min

