

PKU-larm - akuta åtgärder

1 Rutin vid larmvärde på PKU-screening

1.1 Larmbesked via telefon

- Jourhavande barnläkare får telefonledes information från CMMS alternativt barnhematologen/-immunologen vid Karolinska Sjukhuset beroende på vilket larmvärde som faller ut i screening.
- Informationen innehåller i regel rekommendationer gällande uppföljning och provtagning.

1.2 Läkare kontaktar föräldrar via telefon

- Barnet rings in för klinisk bedömning och uppföljande prover enligt rekommendationerna ovan.
- Fortsatt uppföljning beroende på utredningsvar.

2 SCID och vaccinationer

Vid SCID (Severe Combined Immunodeficiency) får levande vaccin inte ges.

- Varningsmärk journalen i Uppmärksamhetssignalen/behandling och tillstånd.
- Snabb information ska gå till BVC för kännedom inför vaccinationer. Levande vaccin som Rotarix/RotaTeq och BCG får inte ges. Tillse att patienten inte är inplanerad för BCG vid 6 veckors ålder.
- Familjen ska informeras tydligt.

Referenser: Andreas Odland, Barn- och ungdomsmedicin Dalarna/Falun

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare