

PPD - tuberkulinprov

Gäller för: Region Kronoberg

Faktaägare: Ann-Louise Breider, sjuksköterska infektionskliniken Växjö
Elisabeth Pettersson, sjuksköterska infektionskliniken Växjö

Indikation

- Inför BCG-vaccination
- Utredning av tuberkulos
- Inför vissa studier utomlands

Material

- Tuberkulin/PPD, 2 TU/0,1ml, förvaras i kylskåp
- Insulinspruta alternativt kanyl grå +1 ml spruta

Utförande

- 0,1 ml PPD ges intracutant mitt på vänster underarms ovansida.
- Det skall bli en kvaddel på armen.
- PPD ordineras och signerar i Cosmic.

Resultat

Avläses efter 72 timmar genom att mäta indurationen (inte rodnaden) med en linjal. Avläses tvärgående i förhållande till armen. Indurationen anges i mm. Blåsbildning och kraftig rodnad noteras. Resultatet skrivs in i Cosmic under rubrik Mantoux. Nedan finns länk till avläsningsprotokoll.

Tolkning

För tolkning av resultat se Socialstyrelsens riktlinje "TB - vägledning för sjukvårdspersonal" samt Region Kronobergs riktlinje "Tuberkulosvård i Kronobergs län". Se länkar nedan.

Remisser

Remiss med önskemål om PPD eller BCG-vaccination kan skickas till Infektionsmottagningen Centrallasarettet Växjö.

Relaterade dokument

Interna länkar

[PPD-avläsning](#)

[Tuberkulosvård i Kronobergs län](#)

Externa länkar

[Tuberkulos - vägledning för sjukvårdspersonal](#)

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.