

Epiglottit Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Orsak

Infektion

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

S Allmänpåverkan. Tilltagande sväljningssvårigheter. Grötigt tal. Feber. Halsont. Inspiratorisk stridor. Dregling. Vägrar ligga ned.

O Halsont med successiv utveckling av andningsbesvär.

P Vill sitta upprätt, framåtlutad

Q Svullnad i hals försvårar tal, sväljning och andning.

R Lokaliserat till halsen.

S

T Akut tilltagande besvär.

A

M

P Vaccination mot Haemophilus influenzae typ B

L

E

Riktad undersökning

Visuell inspektion av svalg. Stoppa aldrig något i patientens mun – risk för laryngospasm!

Lungauskultation: Inspiratorisk stridor.

Behandling

- **Syrgas** flödas framför ansiktet.
- Inj. **Betametason (4 mg/ml)**, 2 ml iv.
- Transportera sittande på bår, låt dock patienten själv välja kroppsposition.

Specifik övervakning

EKG-övervakning

Tänk på

Snabb avtransport till sjukhus.

Förvarna/tillkalla ÖNH-läkare samt anestesilog.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare