

# Främmande kropp Ambulansverksamheten

**Gäller för:** Ambulansverksamhet

**Utförs på:** Ambulansverksamhet

## Försiktighet

- Felaktig handläggning kan ge totalt luftvägsstopp!

## Specifik behandling

### Patient som har bra hostkraft

- Uppmuntra till att fortsätta hosta!
- Patienten väljer sin egen bästa position (ofta sittande).
- Ge **Syrgas** vid saturationspåverkan
- Omgående transport in till sjukhus. Förvarna akutmottagning samt ÖNH jour och vid behov narkosjour i god tid.

### Hostkraften börjar avta men patienten är vid medvetande

- Försök med Heimlich manöver, alternativt ryggdunk.
- Öppna och titta i munnen.
- Om möjligt: exstirpera ev. synlig främmande kropp i munhåla eller hypofarynx
- Värdera och vid behov upprepa behandlingen.

### Patienten är medvetslös

- Följ generell behandling för säkerställande av luftväg och ventilation.
- Följ riktlinjer för A-HLR.

### Speciellt att tänka på

- Om längre transportväg till sjukhuset och kritisk patient tillkalla då extra anestesiresurs via SOS (om inte redan utlarmad). Detta ska inte fördröja transporten! Möt upp med extraresursen på vägen till sjukhuset.
- I en livshotande situation om främmande kroppen inte kan exstirperas med laryngoskop och Magills tång gör nödkoniotomi.

## LUFTVÄGSSTOPP

### Andas, hostar eller talar



Uppmana att hosta, kontrollera andning

### Vid medvetande, kan inte andas, hosta eller tala

#### BARN UNDER 1 ÅR



5 ryggslag



5 brösttryck



Titta i munnen

Utför ryggslag och brösttryck växelvis så länge som barnet är vid medvetande eller tills barnet andas normalt. Larma 112 efter ca en minut.

#### BARN ÖVER 1 ÅR / VUXNA



5 ryggslag



5 buktryck

Utför ryggslag och buktryck växelvis så länge personen är vid medvetande eller tills personen andas normalt.

### Medvetslös, ingen andning

Larma 112, starta HLR

#### BARN

Ge 5 inblåsningar och starta hjärt-lungräddning, HLR, med omväxlande 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar (sjukvårdspersonal 15:2). Titta i munnen innan inblåsning.



#### VUXNA

Starta hjärt-lungräddning, HLR, med omväxlande 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar. Titta i munnen innan inblåsning.

Fortsätt HLR tills personen andas normalt eller tills ambulanspersonal tar över.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare