

# Lungödem/ Hjärtsvikt Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

## Försiktighet

- Kontrollera att andningsljud finns bilateralt, frontalt och apikalt för att utesluta en pneumothorax.
- **Glyceryltrinitrat** är kontraindicerat om patienten intagit Viagra-preparat de senaste 24 timmarna.

## Specifik behandling

- CPAP är förstahandsmetod förutsatt att patienten är kontaktbar.
- Välj andningsmotstånd 3-7cm H<sub>2</sub>O beroende på patientens allmäntillstånd och blodtryck.
- Ge spray **Glyceryltrinitrat (0,4mg/dos)** 1-2 puffar under tungan om bltr > 90mm Hg. Kan upprepas efter blodtryckskontroll.
- Ge inj **Furosemid (10mg/ml)** 4ml iv.
- Om oro/andnöd trots CPAP-behandling ge inj. **Morfin (1 mg/ml)** 1-2 ml iv. (syst BT >90). Kan upprepas efter effekt.

## Speciellt att tänka på

- Ta EKG eftersom en akut hjärtinfarkt kan vara orsak till lungödem.
- Var beredd på att assisterad andning kan bli aktuellt.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare