

Hjärtstopp Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Försiktighet

Specifik behandling

- Följ algoritmen för A-HLR vuxen.
- Följ Prehospitalt beslutsstöd för intransport eller avbrytande av HLR.
- Om A-HLR inte är aktuellt, se riktlinje dödsfall utanför sjukhus.
- Återfår patienten bärande cirkulation (ROSC), skickas diagnostiskt EKG för ställningstagande till vilket sjukhus patienten ska transporteras.

Speciellt att tänka på

- Alternativa reversibla orsaker till hjärtstoppet?
 - 4H
 - Hypoxi
 - Hypovolemi
 - Hypo-/hyperkalemi
 - Hypo-/hypertermi
 - 4T
 - Tensionspneumothorax (ventilpneumothorax)
 - Tromboembolism (lungemboli)
 - Tamponad
 - Toxiner (förgiftning)
- Används larynxmask skall kompressions/ventilationsratio vara 30:2.
- Fyll i hjärtstoppregistret.
- Om data från defibrillator önskas av mottagande läkare, se riktlinje Defibrillator FR3 i teknisk handbok.
- Vid beslut om fortsatt användning av LUCAS på sjukhuset följer ambulanspersonalen med patienten och sköter LUCAS.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare