

Bäckenskada Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Försiktighet

- Bedöm kinematiken för eventuell rörelsebegränsning av spinalkanalerna enligt algortim spinal rörelsebegränsning.

Specifik behandling

- Vid cirkulationspåverkad patient med bäckenskada ska alltid bäckenet rörelsebegränsas.
- Om patienten är vaken och cirkulatoriskt stabil rörelsebegränsas bäckenet vid smärta.
- Vid behov smärtlindra enligt riktlinje smärta.
- Påbörja inf. **Ringeracetat** iv.
- Vid misstänkt större traumatisk blödning i bäckenet ge inj. **Tranexamsyra 100mg/ml** 10 ml = 1g administreras i.v. eller i.o till vuxna.
Till barn ge inj. **Tranexamsyra 100mg/ml** 15mg/kg (=0,15 ml/kg) i.v. eller i.o. Vikt kan avrundas till nästa heltal. Maximalt 1g ska ges.
Administrering ska ske inom tre timmar efter trauma.

Speciellt att tänka på

- Bäckenskador kan blöda stora volymer. Förebygg chock!
- Vid misstänkt större blödning i bäckenet försök att ”stänga” bäckenet med hjälp av ett lakan eller dylikt som gördel.
- KED-väst som placeras upp och ned runt bäckenet är ett effektivt sätt att rörelsebegränsa bäckenskador.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare