

## Skallskada/Spinal skada Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

### Försiktighet

- Använd inte nästubb vid fraktur i mellanansiktet..
- Sänk inte huvudändan.

### Specifik behandling

- Spinal rörelsebegränsning enligt algoritm.
- Ge syrgas 10 l/min på mask med reservoar.
- Assistera andningen vid behov.
- Substituera tidigt med vätska vid blodförlust eller chock.
- Bedöm RLS/GCS.
- Vid tecken på inklämning kontakta läkare för vidare ordination.
- Titta efter övriga skador som exempelvis liqvorläckage/blödning ur öra eller näsa.
- Smärtlindra vid behov enligt riktlinje smärta.
- Vid misstanke om traumatisk hjärnblödning med medvetandepåverkan eller andra neurologiska symtom ge inj. **Tranexamsyra 100mg/ml** 10 ml = 1g administreras i.v. eller i.o till vuxna.  
Till barn ge inj. **Tranexamsyra 100mg/ml** 15mg/kg (=0,15 ml/kg) i.v. eller i.o. Vikt kan avrundas till nästa heltal. Maximalt 1g ska ges.  
Administrering ska ske inom tre timmar efter trauma.

### Speciellt att tänka på

- Överväg intubation/narkosassistans vid lång transport.
- Tänk på risken med sedering, senare diagnostik försvåras.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare