

## Epiglottit, barn Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

### Orsak

Infektion

### Initial bedömning

ABCDE

### Riktad anamnes

**S** Allmänpåverkan. Tilltagande sväljningssvårigheter. Grötigt tal. Feber. Halsont. Inspiratorisk stridor. Dregling. Vägrar ligga ned.

**O** Halsont med successiv utveckling av andningsbesvär.

**P** Vill sitta upprätt, framåtlutad.

**Q** Svullnad i hals försvårar tal, sväljning och andning.

**R** Lokaliserat till halsen.

**S** Livshotande.

**T** Akut tilltagande besvär.

**A**

**M**

**P** Vaccination mot Haemophilus influenzae typ B

**L** Inkluderar nappflaska/amning.

**E**

### Riktad undersökning

Visuell inspektion av svalg. Stoppa aldrig något i patientens mun - risk för laryngospasm!  
Inspiratorisk stridor.

## Behandling

- **Syrgas** flödas framför ansiktet om barnet accepterar detta
- Transportera sittande på bår
- Applicera **Lidokain/ Prilokain-plåster** Barn 0-2 mån: 1 st plåster.  
Barn >3mån: 2 st plåster.

## Övervakning

EKG-övervakning

## Tänk på

Epiglottit är ett livshotande tillstånd.

Prioritera snabb avtransport, skapa lugn miljö, undvik smärtsamma eller orosskapande åtgärder.

Förvarna/tillkalla högre medicinsk kompetens.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare