

# Stesoliddropp vid onkologkliniken

**Gäller för:** Onkologkliniken

**Utförs på:** Onkologkliniken

**Faktaägare:** Martha Olsson, överläkare, Onkologkliniken

## Innehållsförteckning

1	Behandling.....	1
1.1	Farmakologisk.....	1

## 1 Behandling

### 1.1 Farmakologisk

**Indikation:** i livets slutskede vid svår ångest, psykomotorisk oro och som komplettering till analgetika. Obs! I första hand används Midazolamdropp, se [Palliativ sedering med Midazolam i livets slut](#). När Midazolam inte ger tillräcklig symtomlindrande effekt bör narkosläkare kontaktas för ställningstagande till Propofol-sedering.

Stesoliddropp används bara i undantagsfall, som alternativ till Midazolam, om Midazolam av något skäl inte kan användas.

#### Blandning:

Injektionslösning Stesolid 5 mg/ml	<b>10 ml</b>
Glukos 50 mg/ml	<b>240 ml</b>

Detta sker genom att man drar ur 10 ml ur en 250 ml infusionspåse Glukos.

Det ger en koncentration Stesolid på **0,2 mg/ml**.

Skriv in droppet i Cambio Cosmic enligt följande:

Glucos 50mg/ml Fresenius 250 ml

Under tillsatser: Stesolid Novum 5mg/ml; då kommer det upp 2ml i rutan till höger och detta ändras till 10 ml. Tryck på ”dosera”.

Dosera 240 ml/dygn och nedanför skriv infusionstid 10 ml/h och sedan på ”min” 10 ml/h och på ”max” 25ml/h.

Skriv även in Inj Stesolid Novum 5mg/ml 0,5-1 ml vid behov; denna ordination används för att ge eventuella bolusdoser som kan ges genom att droppakten ökas enligt nedan:

Infusionshastighet:

Önskad stesolidtillförsel:	2 mg/h	3 mg/h	4 mg/h	5 mg/h
Infusionshastighet	10 ml/h	15 ml/h	20 ml/h	25 ml/h

Bolusdos:

Öka droppakten till 1000ml/h

Ges 45 sek = 2,5 mg Stesolid

Ges 90 sek = 5 mg Stesolid

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare**