

Flumazenil - Flumazenil Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Flumazenil, injektionsvätska (0,1 mg/ml)

Indikation

- Terapeutiskt: Upphävande av kvarstående bensodiazepinpåverkan då benzodiazepiner används vid sedering, induktion och underhåll av anestesi
- Diagnostiskt: För differentialdiagnos vid misstanke på att sänkt medvetandegrad beror på överdosering av benzodiazepiner

Försiktighet

- Kan hos kroniska missbrukare av benzodiazepiner ge abstinens
- Behandling av epilepsipatienter som står på långtidsbehandling med benzodiazepiner
- Behandling av blandförgiftning t.ex. tricykliska antidepressiva och benzodiazepiner

Kontraindikationer

- Överkänslighet mot ingående substanser

Biverkningar

- Illamående och kräkningar

Doser

Vuxen

- Ge inj. Flumazenil (0,1 mg/ml) 3 ml i.v. Om tillräcklig vakenhet och andningsfunktion inte uppnås kan upprepade doser om 1-2 ml ges

Barn

- Vid ventilationskrävande dos av bensodiazepin känd eller misstänkt hos barn, kontakta barnläkare för vidare behandling av ev. inj. Flumazenil (0,1 mg/ml) i.v.

Giltig fr.o.m: 2019-01-31

Giltig t.o.m: 2021-10-31

Identifierare: 43996

Flumazenil - Flumazenil Ambulansverksamheten



Speciellt att tänka på

- Efter att flera doser getts utan att ge signifikant förbättring måste en icke bensodiazepinetiologi antas.
- Vid administrering av läkemedlet tas kramptröskeln bort vilket kan ge svårigheter att häva uppkomna kramper.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare