

Fentanyl - Fentanyl Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Fentanyl injektionsvätska (50 µg/ml)

Indikationer

- Smärtlindring

Försiktighet

- Kan orsaka andningsdepression, hypotension och kräkning
- Används med försiktighet vid astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom och chock
- Kan maskera tecken och symtom vid ett skalltrauma. Bör undvikas till patienter med nedsatt cerebral cirkulation

Kontraindikationer analgesi

- Får inte ges till patienter med andningsdepression
- Får inte ges till patienter med sekretstagnation

Biverkningar

- Yrsel
- Bradykardi och övergående blodtrycksfall
- Andningsdepression, apné
- Illamående och kräkningar
- Muskelrigiditet (inklusive bröstkorghmuskulatur)

Doser analgesi

Vuxen

- Ge **Fentanyl (50µg/ml)**, 2 ml intranasalt (1 ml i vardera näsborren).

Barn

- Ge **Fentanyl (50µg/ml)** intranasalt enl. tabell (halva volymen i vardera näsborren).

Barn	Fentanyl 50µg/ml intranasalt
Vikt	Volym
20 kg	0,6 ml
30 kg	0,9 ml
40 kg	1,2 ml
50 kg	1,5 ml

Dos inför intubation

- Inj. Fentanyl (50µg/ml)** 1,5-3µg/kg i.v.

Speciellt att tänka på

- Om andningsdepression eller hypotension uppträder ventiler patienten och ge eventuellt **Naloxonhydroklorid**. Under långa transporter kan upprepade doser behövas om andningsdepression uppträder.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare