

Riktlinje  
Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård

Område: Läkemedel

Giltig fr.o.m: 2019-01-31

Giltig t.o.m: 2021-10-31

Faktaägare: Alexander Leptien, MLA Ambulansverksamheten

Fastställd av: Lars Andersson, MLA Ambulansverksamheten

Revisions nr: 3

Identifierare: 44008

## Cordarone - Amiodaron Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Amiodaron, injektionsvätska (50 mg/ml)

### Indikationer

- Ventrikelflimmer
- Pulslös ventrikeltakykardi

### Försiktighet

- Kan ge bradykardi och överledningsstörningar

### Kontraindikation

- Inga på ovanstående indikation

### Biverkningar

- Huvudvärk
- Hypotension
- Överledningsstörningar
- Tremor
- Kräkningar

### Doser

- Ge inj. **Amiodaron** enl. HLR algoritm. 6 ml i.v. efter 3:e defibrilleringen och sedan 3 ml i.v. om fortsatt VT/VF efter ytterligare 2 defibrilleringar.

### Speciellt att tänka på

- **Amiodaron** är ett mycket potent läkemedel som kan ge ett stort antal biverkningar i efterförloppet vid en lyckad återupplivning.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare