

Bricanyl - Terbutalin Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Terbutalin, injektionsvätska (0,5 mg/ml)

Indikationer

- Astma/KOL
- Prematurlt värkarbete

Försiktighet

- Svårare hjärt-kärlsjukdom
- Okontrollerad hyperthyreos

Kontraindikationer

- Överkänslighet för terbutalin eller övriga ingående substanser
- Takykardi - relativ kontraindikation eftersom den kan vara sekundär till hypoxi som kan försvinna när ventilationen förbättras
- Vissa tillstånd hos moder eller foster där förlängning av graviditeten är riskfylld t.ex. placenta previa. Därför alltid läkarkontakt.

Biverkningar

- Hjärtklappning
- Tremor
- Urticaria

Doser

- Astma/KOL – Ge inj. Terbutalin (0.5 mg/ml) 0.5-1 ml s.c.
- Prematurlt värkarbete – Ge inj. Terbutalin (0.5 mg/ml) 0.5 ml s.c. efter läkarkontakt

Giltig fr.o.m: 2019-01-31

Giltig t.o.m: 2021-10-31

Identifierare: 44013

Bricanyl - Terbutalin Ambulansverksamheten



Speciellt att tänka på

- Beta-receptorblockerare, speciellt icke-selektiva, kan helt eller delvis upphäva effekten av **Terbutalin**.
- **Terbutalin** kan i vissa situationer även ges intravenöst. Gör detta enbart efter läkarordination.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare