

## Betapred - Betametason Tablett Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

### Betametason. tabl 0,5 mg

#### Indikationer

- Astma/KOL
- Allergiska reaktioner
- Viruskrupp (pseudokrupp)

#### Försiktighet

#### Kontraindikationer

#### Biverkningar

#### Doser

##### Vuxen

- Allergisk reaktion – Ge **tabl Betametason 0.5 mg** 10 st p.o. (om inte **inj. Betametason** redan är givet).
- Astma/KOL - Ge **tabl Betametason 0.5 mg** 8 st p.o.

##### Barn

- Allergisk reaktion – läkarkontakt för råd om handläggning
- Astma/obstruktiva besvär, pseudokrupp – Ge **tabl Betametason 0.5 mg** 8 st (om inte **inj. Betametason** redan är givet).

#### Speciellt att tänka på

- Patienter som är så påverkade att de inte kan lämnas i hemmet skall få en venös infart och skall få **Betametason i.v.**
- Steroider har relativt långsamt insättande effekt.
- Tabletterna kan intas utan vatten men ska då söndertuggas väl.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare