

Betapred - Betametason injektion Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Betametason, injektionsvätska (4mg/ml)

Indikationer

- Astma/KOL
- Allergisk reaktion/Anafylaxi
- Epiglottit (vuxen)
- Pseudokrupp
- Transfusionsreaktion (behandlas som anafylaxi)

Försiktighet

Kontraindikationer

Biverkningar

Doser

Vuxen

- Anafylaxi, epiglottit, status astmaticsus – Ge **inj. Betametason (4 mg/ml)** 2 ml. i.v.
- Astma/KOL - Ge **inj. Betametason (4 mg/ml)** 1 ml. i.v.

Barn

- Allergisk reaktion – läkarkontakt för råd om handläggning
- Astma/obstruktiva besvär, pseudokrupp –
Ge Inj. Betametason (4mg/ml), < 6 år, 1ml iv. ≥ 6 år, 2ml iv.

Speciellt att tänka på

- Patienter som är så påverkade att de inte kan lämnas i hemmet skall få en venös infart och skall få **Betametason i.v.**
- Steroider har relativt långsamt insättande effekt.
- Administreras långsamt, 2 ml på ca 1 min.

Giltig fr.o.m: 2019-10-31

Giltig t.o.m: 2025-12-29 00:00:00

Identifikationsnummer: 44016

Betapred - Betametason injektion Ambulansverksamheten



Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare