

Adrenalin - Adrenalin 1 mg/ml Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Adrenalin, injektionsvätska (1 mg/ml)

Indikationer

- Astma/KOL
- Anafylaktisk chock
- Pseudokrupp
- Epiglottit

Försiktighet

- Ge inte intravenöst utan läkarordination

Kontraindikationer

- Inga på ovanstående indikation

Biverkningar

- Huvudvärk, yrsel
- Takykardi, blodtrycksstegring, ventrikulära arytmier
- Oro, tremor
- Mydriasis

Doser

Vuxen – intramuskulärt/inhalativt

- Anafylaktisk chock, astma/KOL - Ge inj. Adrenalin (1mg/ml), 0,3–0,5 ml i.m.
- Epiglottit – Ge inh. Adrenalin (1mg/ml), 2 ml.

Barn - intramuskulärt/inhalativt

- Anafylaktisk chock – Ge **inj. Adrenalin (1mg/ml)** i.m., enl tabell.

Barn	Adrenalin (1,0 mg/ml) intramuskulärt
Vikt	Volym
<10 kg	0,1 ml
10-20 kg	0,2 ml
21-30 kg	0,3 ml
31-40 kg	0,4 ml
>40 kg	0,5 ml

- Astma, epiglottit, pseudokrupp –
Ge **inh. Adrenalin (1mg/ml)** inh., enl tabell. Späd med **Natriumklorid (9 mg/ml)** till 2 ml.

Barn	Adrenalin (1 mg/ml) inhalation
Vikt	Volym
5 kg	0,25 ml
10 kg	0,5 ml
15 kg	0,75 ml
20 kg	1,0 ml
25 kg	1,25 ml
30 kg	1,5 ml
≥40 kg	2,0 ml

Speciellt att tänka på

- **Inj. Adrenalin** iv ges endast vid utebliven effekt av övrig administration av **Adrenalin**. Se riktlinje "**Adrenalin 0,1 mg/ml**"
- Beta-receptorblockerare, speciellt icke-selektiva, kan helt eller delvis upphäva effekten.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare