

## Adrenalin - Adrenalin 0,1 mg/ml Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

### Adrenalin, injektionsvätska (0,1 mg/ml)

#### Indikationer

- Ventrikelflimmer
- Pulslös ventrikeltakykardi
- Asystoli
- Pulslös elektrisk aktivitet (PEA)
- Allvarlig anafylaxi t.ex. anafylaktisk chock
- Astma/obstruktiva besvär

#### Försiktighet

- Kan inducera eller förvärra ventrikulära arytmier

#### Kontraindikationer

- Inga på ovanstående indikation

#### Biverkningar

- Huvudvärk, yrsel
- Takykardi, blodtrycksstegring, ventrikulära arytmier
- Oro, tremor
- Mydriasis

#### Doser

##### Vuxen

- Anafylaktisk chock, astma/KOL - Ge inj. Adrenalin (0.1mg/ml) 3-5 ml i.v. Ges långsamt. Kan upprepas efter 2-5 minuter.
- Hjärtstopp – Ge inj. Adrenalin (0.1mg/ml) i.v. enl. HLR algoritm.

##### Barn

- Anafylaktisk chock, astma – Ge inj. Adrenalin (0.1mg/ml) i.v. enl. tabell.

<b>Barn</b>	<b>Adrenalin (0,1 mg/ml) intravenöst</b>
Vikt	Volym
<10 kg	1 ml
10-20 kg	2 ml
21-30 kg	3 ml
31-40 kg	4 ml
>40 kg	5 ml

### Speciellt att tänka på

- Ges så tidigt som möjligt och i första hand intramuskulärt vid allvarlig anafylaxi. Se ritklinje "Adrenalin 1 mg/ml"
- Beta-receptorblockerare, speciellt icke-selektiva, kan helt eller delvis upphäva effekten.

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare**